

Visti tú tað?

Umleið 10 feroyskar kvinnur fáa staðfest lívmóðurhálskrabba árliga.

15 kvinnur í Føroyum doyðu av lívmóðurhálskrabba í árunum 1994-2006.

Trý prik og regluligar kanningar kunnu nærum beina fyrí lívmóðurhálskrabba.

Ókeypis koppseting

Gentur, sum eru millum 13 og 15 ára gamlar, verða koppsettar ókeypis. Fyri kvinnur, sum eru eldri enn 15 ár, kostar koppsettingin 3.500 krónur.

undurlív
krabbameinsfelagið



SENDISTOVAN



Krabbameinsfelagið, Grønlandsvegur 58
Postboks 1216, FO 110 Tórshavn
Tel. 31 79 59, ffk@krabbamein.fo

10 føroyskar kvinnur

ella har umleið fáa staðfest lívmóðurhálskrabba árliga. Umleið helmingurin av kvinnunum er yngri enn 45 ár. Heilt ungar kvinnur kunnu eisini fáa sjúkuna.

Lívmóðurhálskrabbi er ein sera álvarsom sjúka. Á hvørjum ári doygga umleið ein hálv millón kvinnur kring heimin av lívmóðurhálskrabba.

15 kvinnur

í Føroyum doyðu av lívmóðurhálskrabba í árunum 1994-2006. Tað vil siga, at á hvørjum ári doygga kvinnur av eini sjúku, sum tú kanst fyribryrgja. Við teirri nýggju koppsetningini og regluligum kanningum kunnu vit nærum útrudda lívmóðurhálskrabba.

Hvør er orsókin til lívmóðurhálskrabba?

Høvuðsorsókin til lívmóðurhálskrabba er virusið Human Papillomavirus (HPV). HPV er felagsheiti fyrir fleiri enn 100 ymisk virusslög, sum hvør í sínum lagi eru tal-nevnd. Í minsta lagi 15 HPV-slög elva til krabbamein. HPV 16 og HPV 18 eru orsókin til 70 prosent av øllum tilburðum av lívmóðurhálskrabba.

Hvussu smittar HPV?

Virusið smittar í gjøgnum sex. HPV er ein vanlig smitta hjá monnum og kvinnum. Roknað verður við, at so mong sum 80 prosent av teimum, sum eru seksuelt virkin, hava smittuna. Smittan er serliga vanlig millum ung. Millum 40-45 prosent í aldursbólkinum 15 til 25 ár eru smittað av HPV.

Hvørji eru sjúkueyðkennini við HPV?

Tú fölir ikki virusið, so menn og kvinnur, ið eru smittað, vita tað oftast ikki. Í flestu fórum hvørur virusið av sær sjálvum, eins og krím. Hjá nøkrum kvinnum verður virusið tó verandi, og tær eru í stórra vanda fyrir at fáa lívmóðurhálskrabba.

Um smittan ikki verður fyribrygd og steðgað, so kann tað í ringasta føri ganga soleiðis:

- Tú verður smittað av HPV
- HPV-smittan stendur við í longri tíð
- Tú fært kyknubroytingar í lívmóðurhálsinum
- Kyknubroytingarnar verða til lívmóðurháls-krabbamein

Handan gongdin tekur vanliga nögv ár, men tað kann eisini ganga skjótt.

Koppseting

Tú kanst koppseta teg móti krabbameini í lívmóðurhálsinum. Tað er best, um tú letur teg koppseta, áðrenn tú verður sexuelt virkin. Tað vil siga, áðrenn tú kanst verða smittað av HPV. Kvinnur, sum eru sexuelt virkna, kunnu eisini fáa gagn av koppsetningini. Koppsetningin verður viðmælt øllum millum 9 og 26 ár.

Umframta at verja teg móti HPV 16 og HPV 18, verjir koppsettingin eisini móti HPV 6 og HPV 11, sum eru orsókin til 90 prosent av øllum kambfjaðrum á kynsgjøgnum.

Regluligar kanningar

Hóast tú ert koppsett, er umráðandi at móta til regluligu kanningarnar hjá læknarum, frá tí at tú hefur fylt 25 ár. Saman við koppsetningini kunnu hesar kanningar útrudda lívmóðurhálskrabba.

Endamálið við regluligu kanningunum er at finna og steðga undanstigum til lívmóðurhálskrabba. Kyknubroytingar kunnu vera undanstig til krabbamein, men tær eru ikki krabbamein. Undanstig kunnu viðgerast, so tey ikki elva til krabbamein.

krabbameinsfelagið



Undurlív er eitt átak, sum Krabbameinsfelagið skipar fyrir. Les meira um hetta á www.krabbamein.fo.